

- DENTAMET -

FERTILIZZANTE INTEGRATO



ASSORBIMENTO RAPIDO ED ELEVATA AZIONE SISTEMICA
CORREGGE RAPIDAMENTE LE SITUAZIONI DI CARENZA
MIGLIORA LO STATO FISIOLOGICO DELLA COLTURA



WWW.DIACHEMITALIA.IT

Chimiberg® e Diagro® Marchi di Diachem S.p.A.

LAMELA
Non SI
TOCCA

Guarda il film su
www.lamelanonsitocca.it

 **DIAGRO®**

DENTAMET. UNA FORMULAZIONE INNOVATIVA

CONCIME CE. MISCELA DI MICROELEMENTI in grado di correggere rapidamente situazioni di carenza, anche in nei casi più gravi.

FORMULAZIONE ORIGINALE che assicura un alto livello di compatibilità e una rapida assimilazione nei tessuti vegetali, grazie al basso peso molecolare e a un basso valore di pH.

MIGLIORA LO STATO FISIOLOGICO DELLA COLTURA e potenzia indirettamente la pianta, inducendo maggiore resistenza agli stress.

PUÒ ESSERE IMPIEGATO PER VIA FOGLIARE E/O RADICALE, permanendo nella zona delle radici per circa 2 settimane.



COMPOSIZIONE

rame (Cu) solubile in acqua 2%
zinco (Zn) solubile in acqua 4%

FORMULAZIONE

liquido solubile

DENSITÀ

1.280 g/l

pH

1,0

COLTURA	DOSE	EPOCA D'INTERVENTO
Vite e Uva da tavola	200-300 ml/hl (2,5-3 kg/ha)	Da germogliamento a raccolta
Actinidia		3 interventi da germogliamento a post-fioritura
Altre colture arboree:		
Melo	300-600 ml/hl (3,5-6 kg/ha)	Da punte verdi ad intervalli di 14 gg. In post-raccolta: 20 gg prima della caduta foglie
Pero		All'apertura del fiore centrale e a fine fioritura. Ripetere in caso di rifioritura e immediatamente dopo ogni grandinata. In post-raccolta : 20 gg prima della caduta foglie
Agrumi		5 interventi durante tutto il ciclo colturale
Olivo		5 interventi durante tutto il ciclo colturale
Nocciolo, Noce, Castagno		2 interventi primaverili (aprile e maggio) 1 intervento autunnale (settembre-ottobre)
Melograno		3 interventi da germogliamento a post-fioritura
Drupacee		Interventi da caduta foglie a gemma rigonfia
Colture orticole:		
Pomodoro, Peperone, Melanzana	200-600 ml/hl (2-3 kg/ha)	Interventi ogni 14 gg dal trapianto Ogni 20 gg dalla 4ª foglia vera
Melone, Anguria, Zucchini		
Ortaggi a foglia (spinacio, lattuga, insalate, crucifere...)		
Ortaggi a radice (carota)		
Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio)		
Asparago, Carciofo e Cavoli (a foglia, broccoli, cavolfiore)		Ogni 20 gg durante tutto il ciclo colturale . Anche in fertirrigazione aumentando le dosi fino a 4-7 kg/ha
Fragola		
Colture industriali:		
Patata	200-600 ml/hl (2-3 kg/ha)	2 interventi da pre-fioritura a distanza di 20 gg
Frumento, Riso		2 interventi da botticella a post-fioritura
Colture ornamentali, bulbose da fiore. Tappeti erbosi e Campi da golf		Ogni 30 gg durante tutto l'anno

AVVERTENZE: su pomacee (pero in particolare) e uva da tavola si consiglia di non superare la concentrazione, rispettivamente, dello 0,25% (250 ml/hl) e dello 0,3% (300 ml/hl) nei trattamenti in vegetazione. Su vite non superare la concentrazione dello 0,5% (500 ml/hl) specie nei primi interventi primaverili. Non miscelare con formulati a reazione alcalina. Rispettare un intervallo di almeno 7 gg da applicazioni con oli minerali e dodina. Usare il prodotto nelle ore più fresche della giornata.

DIAGRO marchio di **DIACHEM** S.p.A.

Uffici e stabilimento:

Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG) - Tel. 0363 355611

info@diachemitalia.it www.diachemitalia.it

Azienda con Sistema di Gestione Certificato:

QUALITÀ ISO 9001, SICUREZZA ISO 45001, AMBIENTE ISO 14001

Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

